

適正使用のお願い

2012年11月
MSD株式会社

5 α -還元酵素II型阻害薬

◎男性型脱毛症用薬◎

劇薬、処方せん医薬品^{注)}

プロペシア[®]錠 0.2mg

プロペシア[®]錠 1mg

(フィナステリド錠)

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

— 錠剤を分割・粉砕しないでください —

分割・粉砕した本剤に妊婦が接触すると、有効成分が吸収され、本剤の薬理作用（DHT/ジヒドロテストステロン低下作用）により、男子胎児の生殖器官等の正常発達に影響を及ぼすおそれがあります。

本剤を分割・粉砕しないよう、患者様へご指導くださいますようお願い申し上げます。

また、本剤の使用に際しましては、患者様向け説明文書「プロペシア[®]錠服薬ガイド」、「プロペシア[®]錠を服用の患者様へ」及び「くすりのしおり」等をご活用ください。

《調剤及び服用時の注意》

- ・本剤を分割・粉砕しないでください。
- ・本剤が粉砕・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人に、本剤を取扱わせないでください。

本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の手扱いにおいて有効成分に接触することはありません。

《分割・粉碎に関する使用上の注意（抜粋）》

プロペシア[®]錠0.2mg、プロペシア[®]錠1mg

禁忌（次の患者には投与しないこと）

- (2) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人〔「重要な基本的注意」、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

重要な基本的注意

本剤の使用に際しては、患者に次の事項を説明すること。

- (1) 本剤を妊婦に投与すると、本剤の薬理作用（DHT低下作用）により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがある。〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕
- (2) 本剤を分割・粉碎しないこと。
本剤が粉碎・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の取扱いにおいて有効成分に接触することはない。〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔「重要な基本的注意」の項参照〕
- (2) 授乳中の婦人には投与しないこと。〔本剤がヒト乳汁中へ移行するかは不明である。〕

適用上の注意

- (1) 調剤及び服用時：本剤を分割・粉碎しないこと。
本剤が粉碎・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。

リンク集

プロペシア錠 製品情報サイト

・ 添付文書

・ 医薬品インタビューフォーム

・ 製剤写真

・ くすりのしおり

<http://www.msd.co.jp/hcp/product/alopecia/Pages/home.aspx>

http://www.msd.co.jp/Documents/hcp/productinfo/information/pi_propecia_tab.pdf

http://www.msd.co.jp/Documents/hcp/productinfo/interviewform/if_propecia_tab.pdf

http://www.msd.co.jp/hcp/productinfo/agent/Pages/propecia_tab1.aspx

http://www.msd.co.jp/Documents/hcp/productinfo/guide/g_propecia_tab02.pdf

http://www.msd.co.jp/Documents/hcp/productinfo/guide/g_propecia_tab1.pdf

疾患啓発サイト AGA-news

<http://aga-news.jp/index.html>

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

「製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」

http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_info/file/kigyo_oshirase_201108_2.pdf



MSD 株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12
ホームページ <http://www.msd.co.jp/>

製品情報お問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター

医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961

<受付時間>9:00~18:00（土日祝日・当社休日を除く）