

# くすりのしおり

内服剤

2009年7月作成

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：シアリス錠20mg

主成分：タダラフィル (Tadalafil)

剤形：くすんだ黄色の錠剤、長径約12.3mm、短径約7.6mm、厚さ約5.0mm

シート記載：Cialis 20mg、シアリス20、シアリス20mg、ニトログリセリンなどの硝酸薬と本剤は併用できません



## この薬の作用と効果について

PDE5という酵素を阻害することにより海綿体のcGMPを増加させます。その結果、平滑筋が弛緩し、陰茎組織への血流が増加して勃起が生じます。なお、性的刺激がなければ勃起は生じません。通常、勃起不全(満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない状態)の治療に用いられます。この薬は、催淫剤または性欲増進剤ではありません。また、性行為感染症を防ぐ効果はありません。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心血管系障害、不安定狭心症、性交中に狭心症を起こした、不整脈、低血圧、高血圧、最近3ヵ月以内に心筋梗塞を起こした、最近6ヵ月以内に脳梗塞・脳出血を起こした、肝障害、網膜色素変性症がある。
- 他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。

## 用法・用量(この薬の使い方)

- あなたの用法・用量は(医療担当者記入)
- 通常：通常、成人は1日1回主成分として10mgを性行為の約1時間前に服用しますが、十分な効果が得られず、忍容性が良好と判断された場合には1回20mgに増量されることがあります。服用間隔は24時間以上あけてください。  
軽度または中等度の肝障害がある場合：通常、成人は1日1回主成分として10mgを性行為の約1時間前に服用しますが、この量を超えて飲まないでください。服用間隔は24時間以上あけてください。  
中等度の腎障害がある場合：通常、成人は1日1回主成分として5mgから開始され、性行為の約1時間前に服用します。服用間隔は24時間以上あけてください。最高1錠(10mg)に増量されることがありますが、この量を超えて飲まないことと、服用間隔は48時間以上あけてください。  
重度の腎障害がある場合：通常、成人は1日1回主成分として5mgを性行為の約1時間前に服用しますが、この量を超えて飲まないでください。服用間隔は24時間以上あけてください。  
この薬は1錠中に主成分20mgを含有します。いずれも必ず指示された服用方法に従ってください。
- 絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

## 生活上の注意

- めまいや視覚障害(眼のかすみなど)があらわれることがありますので、高所での作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときには十分注意してください。
- グレープフルーツジュースは薬の作用を増強させ、副作用も強める可能性があるため、控えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと(副作用)

主な副作用として、頭痛、潮紅、ほてり、消化不良、背部痛、筋痛、鼻閉、四肢痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 発疹、顔のむくみ、唇や口内・結膜のただれ[過敏症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。