

# シルデナフィルOD錠50mgVI「トーワ」を 適正にご使用いただくために

患者さんとパートナーの方のために

この薬を服用する際には、注意しなければならない  
点がありますので、お薬を飲む前にこのパンフレット  
を必ずお読みください。

連絡先(病医院・薬局名)



東和薬品株式会社

2014年7月改訂(C-2)

## シルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」を 飲む前に…

あなたにシルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」が処方されました。

外国および国内において、シルデナフィル製剤が原因であることを否定できない死亡例も報告されていますので、このパンフレットを熟読してください。

診察をうける際に、あなたの症状や過去および現在の他の病気・薬剤について、主治医にすでに十分に話されましたでしょうか？

シルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」は、障害されたあなたの勃起機能を改善するための薬ですが、飲み方を誤ると、**重大な副作用があらわれ、命にかかわることがあります。**

この冊子には、シルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」に関する大切な情報が記載されていますので、この薬をお飲みになる前に、必ずお読みください。さらに、お聞きになりたいことがある場合は、医師または薬剤師までおたずねください。

**狭心症などで、硝酸薬で治療中の方や、  
不整脈で抗不整脈薬で治療中の方は  
服用しないでください。**

この薬は、すべての方に適するわけではありません。硝酸薬(飲み薬・舌下錠・貼り薬・注射・吸入剤など)、抗不整脈薬(アミオダロン塩酸塩)を使っている方は、決して本剤を服用しないでください。

例えば、狭心症の発作の治療によく処方されるニトログリセリンを飲んでいたり、貼り薬を貼っている方、吸入している方などは、血圧が危険なレベルまで下がり、死に至ることがありますので、絶対に服用しないでください。

また、他にも飲んでいたりする薬があれば、必ずそのことを医師または薬剤師にお話してください。

**性行為は心臓に負担をかけます。この薬を飲む前に、健康状態について医師とよく話しましょう。**とくに心臓に関する持病のある方(狭心症や重度の心血管系障害・心不全など)や脳血管に病気のある方(脳出血、脳梗塞など)は、**死に至ることがありますので、必ず医師にご相談ください。**

**もし、服用後に発作が起きたら…。**

今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心症の発作を起こす場合があります。本剤を服用後、狭心症が起きた場合の治療法の選択には十分な配慮が必要となります。場合によっては、一般に発作の治療によく用いられている硝酸薬が使用できず、他の薬剤を用いなければならないことがあり、その際には、硝酸薬と同じ効果が得られないことがありますことをご承知おきください。

また、発作の治療を受ける際には、発作治療薬の選択のために、必ず本剤を服用した時間を主治医にお伝えください。

発作時に自ら主治医に伝えられない場合もありますので、パートナーにもあらかじめ本剤を服用していることを伝え、救急医療機関を受診する際には、医師などに「シルデナフィル OD 錠50mgVI「トーフ」を服用している」ことが必ず伝わるようにしてください。

ご本人、パートナー、家族の方々が、シルデナフィル OD 錠50mgVI「トーフ」服用の事実を医師に告げられない場合には、狭心症等の治療のために硝酸薬が使用され、血圧が危険なレベルまで下がり、死に至ることがあります。したがってパートナーの方に必ず本剤を服用していることを伝えてください。

## つぎのような方も、 服用しないでください。

今までに、シルデナフィル製剤（バイアグラなど）を服用してアレルギー（過敏症）を起こした方

心血管系障害などのために医師から性行為が不適当だと診断された方

重症の肝臓病の方

低血圧の方（とくに最高血圧が90mmHg未満または最低血圧が50mmHg未満の方）や高血圧の方（最高血圧が170mmHg以上または最低血圧が100mmHg以上の方）

脳血管に病気のある方（脳梗塞・脳出血）や心筋梗塞を起こした方

網膜色素変性症（進行性の夜盲）と診断された方

また、腎臓の病気、肝臓の病気、赤血球の異常（鎌状赤血球性貧血）、白血病、多発性骨髄腫、血が止まりにくい病気、薬物アレルギー、胃・十二指腸潰瘍、遺伝性の目の病気、ペニスに関する病気または奇形のある方、他の勃起不全治療薬・勃起補助器具を使用している方や手術を受けた方も、必ず医師にご相談ください。

薬物  
アレルギー

心血管系  
障害

重症の  
肝臓病

高血圧  
低血圧

脳血管障害

網膜色素  
変性症




シルデナフィルOD錠  
50mgVI「トーワ」

## 副作用があらわれたときは、 医師にご相談を。


この薬によって、「気分が悪くなる」「頭痛」「顔が赤くなる(ほてり)」「消化不良」などの副作用があらわれることがあります。また、光に過敏になる、色が変化して見えるなど、一時的に眼に影響のあらわれる方もあります。長期に服用される場合には、眼の検査などについて医師にご相談ください。また、こうした症状の他にも、副作用があらわれることがありますので、異常を感じたときには服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

なお、勃起の持続によってペニスに損傷し勃起機能を永続的に失うことがありますので、シルデナフィル OD錠 50mgVI「トーワ」服用後4時間以上勃起が続く場合は、すぐ医師に連絡してください。



## 他の人にあげるのは厳禁です。

この薬は、あなたのために処方された薬です。パートナーや他の人に絶対あげないでください。その人が性行為をするには不適當な病気(心臓病など)にかかっていたり、この薬を服用するには不適當な病気(肝臓病など)にかかっていたり、他の薬(心臓病の薬など)を飲んでいたりする場合もあり、危険だからです。この薬の服用には必ず医師の診断のもとに処方を受ける必要があります。



## 性行為の約1時間前に服用しましょう。

この薬は、性行為の前に服用する内服薬です。

**飲む時間** 性行為の約1時間前に、飲んでください。

また以下の点にも注意してください。

食事をした後に飲むと、効果が出るまでに時間がかかります。

この薬の服用後、めまいや視覚障害（色に変化して見えるなど）があらわれることがありますので、自動車や機械の運転操作をする場合にはご注意ください。

## 1日1回まで24時間以上あけて服用。

この薬は性的刺激に反応して起こる勃起機能をサポートします。

1回に服用できる量は医師に指示された25mgまたは50mgまでです。それ以上飲んではいけません。医師の処方に従って飲んでください。

薬の効き方には個人差があり、効果を得られなかった場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

この薬は催淫剤や性欲増進剤ではありません。

決して、自分で量を増やしてはいけません。処方された量以上を服用しても、効果の増大は望めず、かえって新たな副作用が出現したり、その程度が強くなることがあります。また、1日1回までの服用回数を守ってください。つぎに飲むときは、必ず24時間以上あけてください。



## 医師の指示により、 25mgを服用する場合

医師の指示により25mgを服用する場合は、1錠(50mg錠)を半分に割って服用してください。



## シルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」は 水なしでも飲むことができます。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠です。普通の薬のように、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

### 水なしで飲む場合

舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。

水で飲んだ場合と効き目は変わりません。

水なしで寝たまま飲まないでください。  
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

## 他の医療機関を受診するときは、 シルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」を 服用していることを申し出てください。

他の薬(特に心臓病)との相互作用や他の病気との影響が出て、危険な場合がありますので、必ずシルデナフィルOD錠50mgVI「トーフ」を服用していることを申し出てください。

## 服用後、性的刺激を受けなかった場合

性的刺激を受けなければ、勃起することはなく、また性的刺激が中止されれば、勃起もおさまりません。なお、何か異常がある場合には医師にご相談ください。

## 性行為感染症を防ぐことはできません。

この薬では、エイズなど性行為によって感染する病気(性行為感染症)を防ぐことはできません。

## 視覚・聴覚に異常を感じた場合

視覚・聴覚に異常を感じた方は、服用を中止し、医師にご相談ください。

## 以下のように保管してください。

光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。

誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

ご不明な点は  
医師または薬剤師まで  
おたずねください。



## 主な併用禁忌薬販売名リスト

シルデナフィル OD 錠50mgVI「トーフ」と一緒に服用してはいけない主な薬です。

### 内用薬

- アイトロール錠
- アデムパス錠
- アミオダロン塩酸塩錠
- アンカロン錠
- 一硝酸イソソルビド錠
- ジアセラL錠
- シグマート錠
- 硝酸イソソルビド徐放錠
- ニコランジル錠
- ニコランマート錠
- ニトログリセリン舌下錠
- ニトロベン舌下錠
- ニトロールRカプセル
- ハイパジールコーワ錠
- フランドル錠

### 外用薬

- 亜硝酸アミル
- ジドレンテープ
- 硝酸イソソルビドテープ
- ニトロダームTTS
- ニトロールスプレー
- バソレーターテープ
- フランドルテープ
- ミオコールスプレー
- ミニトロテープ
- ミリステープ
- メディトランステープ

- ・内用薬、外用薬の主な販売名を記載しています。
- ・詳しくは医師・薬剤師にご相談ください。